

酚咖片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称： 酚咖片
商品名称： 天瑞特
英文名称： Paracetamol and Caffeine Tablets
汉语拼音： Fenka Pian

【成份】 本品为复方制剂，每片含主要成份为对乙酰氨基酚 500 毫克和咖啡因 65 毫克。
辅料为：玉米淀粉、低取代羟丙纤维素、柠檬黄、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁。

【性状】 本品为淡黄色或黄色片。

【作用类别】 本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解轻至中度疼痛，如头痛、偏头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛、痛经及关节痛等。

【规格】 对乙酰氨基酚 500 毫克和咖啡因 65 毫克。

【用法用量】 口服。成人一次 1 片，若症状不缓解，间隔 4-6 小时可重复用药一次，24 小时内不超过 4 次。

【不良反应】 不良反应较少。对胃无刺激性，不引起胃出血，偶见皮疹、荨麻疹、药热及白血球减少等不良反应，长期大量用药会导致肝、肾功能异常。

【禁忌】 严重肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】 1、本品为对症治疗药，用于解热连续应用不得超过 3 天，用于止痛不得超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。
2、不能同时服用含有对乙酰氨基酚及其他解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
3、出现皮疹、荨麻疹等过敏反应时，应立即停药就医。
4、肝、肾功能不全患者、老年患者慎用。
5、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
6、运动员应在医师指导下使用。
7、对阿司匹林过敏者慎用。
8、服用本品期间禁止饮酒或含有酒精的饮料。
9、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10、本品性状发生改变时禁止使用。
11、请将本品放在儿童不能接触的地方。
12、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】 1、应用巴比妥类（如苯巴比妥）或解痉药（如颠茄）的患者，长期应用本品可致肝损害。
2、本品与氯霉素同服，可增强后者的毒性。
3、长期大量与阿司匹林或其他非甾体抗炎药合用时，有明显增加肾毒性的危险。
4、本品与抗病毒药齐多夫定（Zidovudine）合用时，可增加其毒性，应避免同时应用。
5、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品含有对乙酰氨基酚能抑制前列腺素的合成而产生解热镇痛作用;咖啡因为中枢兴奋药,由于它能够收缩脑血管,减轻其搏动的幅度,故与解热镇痛药配伍能增强镇痛效果。

【贮藏】 遮光,密封保存。

【包装】 铝塑包装(药用铝箔+聚氯乙烯固体药用硬片),每板10片,每盒1板;每板10片,每盒2板。

【有效期】 24个月。

【执行标准】 《中国药典》2020年版二部

【批准文号】 国药准字H10970370

【说明书修订日期】 2024年08月01日

【上市许可持有人】 名称:青岛国信制药有限公司

注册地址:青岛经济技术开发区团结路3601号

【生产企业】 企业名称:青岛国信制药有限公司

生产地址:青岛经济技术开发区团结路3601号

邮政编码:266426

电话号码:400-080-0001

网 址: www.zy.qdgxjt.com

邮 箱: gxxy@qdgxjt.com

如有问题可与生产企业联系